

Simulation en laboratoire SOI 1043 Scénario Soins intensif	
Thème : Évaluation physique initiale d'un usager intubé aux soins intensifs en choc septique	Nbre de participants : 4 Durée : 1hr
Objectifs d'apprentissages	
- Effectuer la prise en charge et l'évaluation physique initiale d'un usager intubé aux soins intensifs en choc septique (tête aux pieds) - Ajuster les traitements prescrits et en cours	
Profil de l'utilisateur	
Nom, prénom : Bourdoin, Jean Sexe : Masculin Âge : 70 ans Poids : 100kg Grandeur : 5'8 ATCD : diabète de type 1, angine, coronarographie en 2000 dilaté stenté sur IVA, dyslipidémie, HTA Allergie : aucune	Médications personnelles à la maison : Asaphen 80 mg po die Lopresor 50 mg po bid Lipitor 80 mg po die Altace 5 mg po die Humulin R 5 un s/c tid ac Lantus 20 un s/c hs Nitro spray buccal 0.4mg q 5 min max 3 doses prn
Scénario initial	
Vous êtes en stage à l'unité des soins intensifs sur le quart de soir (16h-00h). Vous débutez votre quart de stage accompagné de votre préceptrice. L'infirmière de jour vous transmet le rapport de Monsieur Bourdoin admis cet après-midi. Les informations dont elle vous fait part sont les suivantes : il s'agit d'un homme qui s'est présenté à l'urgence pour choc septique sur une infection urinaire avec une diminution de l'état de conscience. Il est présentement sous ventilation artificielle (intubation endotrachéale) et maintenue confortable avec des perfusions intraveineuses de sédatif et analgésique. Sa dernière glycémie capillaire a été faite à 15h30 et le résultat indiquait 14.5. Il a déjà reçu 2 litres de bolus de NaCl 0.9%, car il était hypotendu et est maintenant avec une perfusion intraveineuse de vasopresseur. Les analyses de laboratoires ont été faites et une première dose d'antibiotique intraveineux a été administrée. Un contrôle du gaz artériel 1hr post intubation a été fait à l'instant. Vous recevrez donc le résultat sous peu. Il a également reçu du tylenol IR à 15h00 pour une température à 39.2 rectale.	