

# Parcours Bioblitz UQO

Parc de la gatineau

Parc des Chars-de-Combat

ferme Moore

Cimétière

Terrain synthétique

UQO

Parc Bréboeuf



# À ne pas confondre!

feuille

fleur

Tige

Racine

feuille

fleur

Tige

Racine



**Carotte Sauvage**  
non-toxique

**VS**

**Ciguë Maculée**  
**(Poison Hemlock)**

**Toxique (ne pas ingérer)**

feuillage  
dentelée



tige poilue



## Herbe à Poux

l'une des principales responsables  
de la rhinite allergique saisonnière


VS



en forme de  
buisson



feuille centrale  
plus longue



3 feuilles lustrées

## Herbe à Puce

peut causer une dermatite  
de contact

Peu ou pas de taches rouges sur la tige et couverte de poils blancs soyeux



**Berce Laineuse**  
non-toxique

**VS**

Beaucoup de rouge et peu de poils. Umbelles (regroupement de fleurs) plus larges



**Berce du Caucase**  
Lorsque la sève est activée par la lumière, elle rend la peau extrêmement sensible au soleil (brûlure)



## **Panais Sauvage**

**La sève et les feuilles/fleurs du panais sauvage peuvent causer chez les humains, une irritation de la peau de type phytophotodermatite. Les symptômes peuvent apparaître 24 à 48 h après exposition**